
年齢
種別
出生時
1か月
2か月
3か月
6か月
1歳
1歳6か月
2歳
3歳
4歳
5歳
6歳
7歳
7歳6か月
8歳
9歳
10歳
11歳
12歳
13歳
14歳
15歳
16歳
接種
望ましい標準的な接種年齢
接種が定められている年齢
BCG
1回
1歳まで（1歳になる日の前日まで）
4種混合
（ジフテリア・破傷風・百日咳・不活化ポリオ）
4回
・生後3か月以上7歳6か月まで
・20日の間隔をおいて3回接種後、
6か月以上（1年～1年6か月後が望ましい）の間隔をおいて1回追加接種
2種混合
（ジフテリア・破傷風）
11歳～13歳未満（未満とは、13歳になる日の2日前まで）
1回
麻しん・風しん
（MR）
1期
1回
1歳～2歳まで（2歳にまる日の前日まで）
2期
1回
・H23年4月2日～H24年4月1日生まれのお子さんが対象
・小学校入学前の1年間（H29/4/1～H30/3/31）の間に1回接種
日本脳炎
1期
・生後6か月以上7歳6か月まで
6日以上の間隔をおいて2回接種後、6か月以上の間隔をおいて1回追加接種
2期
9歳～13歳未満（未満とは、13歳になる日の2日前まで）
1回
ヒブ
接種開始
年齢により、
接種回数が
異なります。
7か月に至るまでに開始した場合
27日（医師が認めた場合20日）以上の間隔をおいて3回接種後、7か月以上の間隔をおいて1回接種
小児用肺炎球菌
7か月に至るまでに開始した場合
27日以上の間隔をおいて3回接種後60日以上おいて、12か月に至った日以降において1回接種
子宮頸がん予防
H13年4月2日～H18年4月1日生まれの女子が対象
小学校6年～高校1年生相当　標準的接種年齢　中1
3回
水痘
2回
・1歳～3歳未満（3歳になる日の2日前まで）
・標準的には1歳から1歳3か月になるまでの間に1回接種し、
1回終了後3か月以上の間隔をおいて（標準的には6か月から12か月）、2回目接種
B型肝炎
3回
1歳まで（1歳になる日の前日まで）